

NOVALAC

ALLERNOVA AR+

	/100ml	Novalac Allernova AR+
Energie	kcal	68
Equivalent protéique	g	1,6
Caséines	%	100
Lactosérum	%	0
Hydrolysats	%	poussé
Lipides	g	3,5
Ac.linoléique	g	0,6
Ac.α-linolénique	mg	58
DHA (Acide docosahexaénoïque)	mg	16
ARA (Acide arachidonique)	mg	4
Glucides	g	7,2
Lactose	%	0
Maltodextrine	%	98,6
Amidon	%	1,4
Sels minéraux		
Sodium	mg	24
Potassium	mg	82
Chlorure	mg	54
Calcium	mg	78
Phosphore	mg	45
Magnésium	mg	6,8
Fer	mg	0,7
Zinc	mg	0,5
Cuivre	mg	0,05
Manganèse	mg	0,007
Fluorure	mg	<0,06
Sélénium	µg	3
Chrome	µg	<6,1
Molybdène	µg	<6,1
Iode	µg	14
Vitamines		
A	µg	59
D	µg	1,6
E	mg	1,2
K	µg	4,1
C	mg	8,1
Thiamine	mg	0,11
Riboflavine	mg	0,2
Niacine	mg	0,6
B6	mg	0,08
Acide folique	µg	14
Folates	µg-EFA	23
B12	µg	0,2
Biotine	µg	2
Acide pantothénique	mg	0,7
Choline	mg	23
Inositol	mg	10,8
Taurine	mg	5,4
L-carnitine	mg	2,7
Dilution	%	13,5

1 mesurette pour 30 ml d'eau

REGURGITATIONS ET APLV

Le premier choix en cas de symptômes d'une allergie aux protéines de lait de vache (APLV) est une diète d'élimination. Les régurgitations font aussi partie des symptômes d'une APLV (primaire ou secondaire).

NOVALAC ALLERNOVA AR+

Le premier hydrolysats poussé épaissi pour la prise en charge à la fois de l'APLV et des régurgitations.


COMPOSITION ADAPTEE

- Hydrolysats poussé de caséines sûr et efficace (99% de protéines < 2000 daltons)⁽¹⁾.
- Complexe PAX: complexe épaississant breveté (Pectine, caroube, amidon):
 - Epaississement efficace indépendamment du degré d'acidité;
 - Améliore le confort digestif.
- Sans lactose pour une tolérance optimale.

EFFICACITE PROUVEE

Après 14 jours:

- Diminution significative:
 - du score CoMiSS et de l'index SCORAD⁽¹⁾;
 - du nombre de bébés qui :
 - pleurent >1,5 h/j
 - ont un sommeil agité⁽¹⁾.
- Normalisation de la consistance des selles (chez 90% des enfants)⁽¹⁾.
- Amélioration significative des courbes de croissance⁽¹⁾.



Produit	De – à
Novalac Allernova AR+ 400 g	0 – 36 mois



CoMiSS = The Cow's Milk-related Symptom Score
SCORAD = Scoring atopic dermatitis

(1) Dupont et al., 2016, BMC Pediatrics, 16:96 -DOI 10.1186/s12887-016-0637-3: Tolerance and growth in children with cow's milk allergy fed a thickened extensively hydrolyzed casein-based formula.