

NOVALAC

DIARINOVA

	/100ml	Novalac DIARINOVA
Energie	kcal	64
Protéines	g	2,3
Caséines	%	90
Lactosérum	%	0
Lipides	g	3,1
Ac.linoléique	g	0,6
Ac.α-linolénique	mg	51
DHA(Acide docosahexaénoïque)	mg	16
ARA(Acide arachidonique)	mg	4
Glucides	g	6,6
Lactose	%	<0,09
Maltodextrine	%	56,1
Amidon	%	10,6
Fructose	%	16,7
Dextrose	%	7,6
Sels minéraux		
Sodium	mg	31
Potassium	mg	83
Chlorure	mg	49
Calcium	mg	48
Phosphore	mg	26
Magnésium	mg	6,5
Fer	mg	0,1
Zinc	mg	0,5
Cuivre	mg	0,05
Manganèse	mg	0,029
Fluorure	mg	<0,06
Sélénium	µg	2,9
Chrome	µg	<5,9
Molybdène	µg	<5,9
Iode	µg	12
Vitamines		
A	µg	55
D	µg	1,6
E	mg	1,1
K	µg	4,6
C	mg	9,8
Thiamine	mg	0,12
Riboflavine	mg	0,2
Niacine	mg	0,7
B6	mg	0,08
Acide folique	µg	13
Folates	µg-EFA	22
B12	µg	0,2
Biotine	µg	2,3
Acide pantothénique	mg	0,7
Choline	mg	21
Inositol	mg	3,3
Taurine	mg	5,2
L-carnitine	mg	1,2
Dilution	%	13

1 mesurette pour 30 ml d'eau

DIARRHEE


A cause des réserves d'eau limitées du nourrisson, une intervention rapide sous contrôle médical est nécessaire.

NOVALAC DIARINOVA

Aliment diététique innovant qui permet d'arrêter rapidement la diarrhée tout en veillant à la réhydratation et à la réalimentation.


COMPOSITION ADAPTEE

- Lait sans lactose: dans les diarrhées virales apparaît en effet une intolérance passagère au lactose.
- Glucose et fructose: réalimentation rapide.
- Maltodextrines et amidon: réalimentation à plus long terme.
- Pectines de fruit:
 - goût agréable (pomme/banane);
 - leur pouvoir gélifiant: permet un retour à une consistance normale des selles.
- Farine de riz:
 - onctueux;
 - contribue à l'absorption de l'eau au niveau du côlon.
- Prédominance en caséine: ralentit la digestion des aliments.
- Extraction de β-lactoglobulines: ↘ risque d'allergie.
- ↗ sels minéraux: ↗ réhydratation.
- Lactobacillus Rhamnosus GG



EFFICACITE PROUVEE

Une étude clinique a démontré qu'en moyenne 28 heures après la première prise de Novalac Diarinoa, il y a déjà un retour à des selles normales ⁽¹⁾.



Produit	De - à
Novalac Diarinoa 600 g	0 – 36 mois



(1) Girardet J-P et al. Clinical Trial of an anti-diarrheal diet: Novalac AD. Excerpts RIP 2001, Tome XXXII; n° 309: 46-8.