

NOVALAC

NOVARICE

	/100ml	Novalac NovaRice
Energie	kcal	66
Equivalent protéique	g	1,8
Caséines	%	0
Lactosérum	%	0
Hydrolysats poussés de riz	%	100
Lipides	g	3,3
Ac.linoléique	g	0,6
Ac.α-linolénique	mg	55
DHA (Acide docosahexaénoïque)	mg	16
ARA (Acide arachidonique)	mg	4
Glucides	g	7,3
Lactose	%	0
Maltodextrine	%	75,4
Amidon	%	20,9
Sels minéraux		
Sodium	mg	30
Potassium	mg	73
Chlorure	mg	53
Calcium	mg	59
Phosphore	mg	40
Magnésium	mg	5,9
Fer	mg	1
Zinc	mg	0,4
Cuivre	mg	0,05
Manganèse	mg	0,005
Fluorure	mg	<0,06
Sélénium	µg	2,9
Chrome	µg	<5,9
Molybdène	µg	<5,9
Iode	µg	13
Vitamines		
A	µg	73
D	µg	1,6
E	mg	1,1
K	µg	4
C	mg	7,9
Thiamine	mg	0,11
Riboflavine	mg	0,2
Niacine	mg	0,6
B6	mg	0,08
Acide folique	µg	11
Folates	µg-EFA	18
B12	µg	0,2
Biotine	µg	2
Acide pantothénique	mg	0,7
Choline	mg	22
Inositol	mg	10,6
Taurine	mg	5,3
L-carnitine	mg	2,6
Dilution	%	13,2

1 mesurette pour 30ml d'eau

ALLERGIE

Les allergies sont déclenchées lorsque les nourrissons sont en contact avec des allergènes. Les protéines de vache et de soja sont des allergènes connus. Un régime d'exclusion est la clé dans le traitement de l'allergie alimentaire.

NOVALAC NOVARICE

En utilisant un hydrolysats de riz fortement poussé comme source protéique, le risque d'allergie est extrêmement réduit.^(4*)

COMPOSITION ADAPTEE

- Le riz comme source de protéines. Il ne contient presque pas d'allergènes et est très nutritif.
- Le profil hypoallergénique du riz est optimisé par une hydrolyse fortement poussée des protéines.
- Le profil des acides aminés est optimisé par l'ajout de L-lysine et L-thréonine.
- Ne contient pas de phytoestrogènes.
- Ne contient pas de lactose.
- Ne contient pas de saccharose.
- A un meilleur goût que les hydrolysats de lait de vache⁽¹⁾.
- L'ajout d'amidon de maïs limite le risque de régurgitations ainsi que les problèmes de selles dus à l'hydrolyse des protéines.⁽⁴⁾

EFFICACITE PROUVEE

- Selon les recommandations actuelles, bonne tolérance chez plus de 90% des enfants avec une APLV confirmée (95% IC)⁽²⁾.
- Normalisation des courbes de croissance et de l'IMC⁽²⁾.
- Diminution significative du nombre de régurgitations⁽²⁾.
- Conduit plus rapidement à une tolérance au lait de vache qu'un hydrolysats de lait de vache ou de soja⁽³⁾.



Produit	De - à
Novalac NovaRice 800 g	0 – 36 mois

(1) Pedrosa M, Pascual CY, Larco JI et al. Palatability of hydrolyzates and other substitution formulae for cow's milk-allergy children: a comparative study of taste, smell, and texture evaluated by healthy volunteers. J Investig Allergol Clin Immunol.2006 ;16 :351-6

(2) Vandenplas Y. et al., Eur J pediatr 2014; 173:1209-1216

(3) Terracciano L, Bouygues GR, Sarraud T et al. Impact of dietary regimen on the duration of cow's milk allergy : a random allocation study. Clin Exp Allergy. 2010 ;40 :637-642

(4) Bocquet et al., Archives de Pédiatrie 2020;26:238-246

(4*) Rice is considered the least allergenic cereal because it triggers undesirable reactions in less than 1% of children with allergies.

IC: Intervale de confiance / IMC: Indice de masse corporelle

