

NOVALAC

ALLERNOVA AR+

	/100ml	Novalac Allernova AR+
Energie	kcal	68
Eiwit equivalent	g	1,6
Caseïnen	%	100
Melkwei-eiwitten	%	0
Hydrolysaat	%	doorgedreven
Lipiden	g	3,5
Linolzuur	g	0,6
α-linoleenzuur	mg	58
DHA(Docosahexaeenzuur)	mg	16
ARA(Arachidonzuur)	mg	4
Koolhydraten	g	7,2
Lactose	%	0
Dextr.-maltose	%	98,6
Zetmeel	%	1,4
Mineralen		
Natrium	mg	24
Kalium	mg	82
Chloride	mg	54
Calcium	mg	78
Fosfor	mg	45
Magnesium	mg	6,8
Ijzer	mg	0,7
Zink	mg	0,5
Koper	mg	0,05
Mangaan	mg	0,007
Fluor	mg	<0,06
Seleen	µg	3
Chroom	µg	<6,1
Molybdeen	µg	<6,1
Jood	µg	14
Vitaminen		
A	µg	59
D	µg	1,6
E	mg	1,2
K	µg	4,1
C	mg	8,1
Thiamine	mg	0,11
Riboflavine	mg	0,2
Niacine	mg	0,6
B6	mg	0,08
Foliumzuur	µg	14
Folaten	µg-EFA	23
B12	µg	0,2
Biotine	µg	2
Pantotheenzuur	mg	0,7
Choline	mg	23
Inositol	mg	10,8
Taurine	mg	5,4
L-carnitine	mg	2,7
*Verdunning	%	13,5

1 maatje in 30 ml water

KOEMELKEIWITALLERGIE EN REGURGITATIES

De eerste keuze bij symptomen van koemelkeiwitallergie is een eliminatiedieet. Deze symptomen worden vaak samen met regurgitaties (primair of secundair) gezien.

NOVALAC ALLERNOVA AR+

Het eerste ingedikte doorgedreven hydrolysaat dat zowel regurgitaties als koemelkeiwitallergie aanpakt.


AANGEPASTE SAMENSTELLING

- Veilig en efficiënt doorgedreven caseïnehydrolysaat (99% van de proteïnen < 2000 dalton)⁽¹⁾
- PAX-complex: gepatenteerde indikking (Pectine, johannesbroodpitmeel, zetmeel)
- Efficiëntie indikking onafhankelijk van de zuurtegraad
- Verbeterd het digestief comfort
- Lactosevrij voor een optimale tolerantie.

BEWEZEN DOELTREFFENDHEID

Na 14 dagen:

- Significante vermindering van
 - de gemiddelde CoMiSS en SCORAD-index⁽¹⁾
 - het aantal baby's die:
 - meer dan >1,5 u/d wenen
 - een geagiteerde slaap hebben⁽¹⁾
- Normalisatie van de stoelgangconsistentie (bij 90% van de kinderen)⁽¹⁾
- Significante verbetering van de gemiddelde groei z-curves⁽¹⁾



Product	Van – tot
Novalac Allernova AR+ 400 g	0 – 36 maand



CoMiSS = The Cow's Milk-related Symptom Score
SCORAD = Scoring atopic dermatitis

(1) Dupont et al., 2016, BMC Pediatrics, 16:96 - DOI 10.1186/s12887-016-0637-3: Tolerance and growth in children with cow's milk allergy fed a thickened extensively hydrolyzed casein-based formula.