

NOVALAC

AR DIGEST+

	/100ml	Novalac AR DIGEST+
Energie	kcal	65
Eiwitten	g	1,4
Caseïnen	%	80
Melkwei-eiwitten	%	20
Lipiden	g	3,3
Linolzuur	g	0,6
α-linoleenzuur	mg	53
DHA(Docosahexaeenzuur)	mg	16
ARA(Arachidonzuur)	mg	4
Koolhydraten	g	7,4
Maltodextrinen	%	54,7
Lactose	%	43,9
Zetmeel	%	1,4
Mineralen		
Natrium	mg	25
Kalium	mg	77
Chloride	mg	58
Calcium	mg	68
Fosfor	mg	44
Magnesium	mg	6,9
Ijzer	mg	0,7
Zink	mg	0,5
Koper	mg	0,05
Mangaan	mg	0,005
Fluor	mg	<0,06
Seleen	µg	2,9
Chroom	µg	<5,9
Molybdeen	µg	<5,9
Jood	µg	12
Vitaminen		
A	µg	55
D	µg	1,5
E	mg	1,1
K	µg	7,8
C	mg	8,5
Thiamine	mg	0,1
Riboflavine	mg	0,2
Niacine	mg	0,6
B6	mg	0,07
Foliumzuur	µg	11
Folaten	µg-EFA	20
B12	µg	0,2
Biotine	µg	2,3
Pantotheenzuur	mg	0,6
Choline	mg	22
Inositol	mg	10,4
Taurine	mg	5,2
L-carnitine	mg	2,6
*Verdunning	%	13

1 maatje in 30 ml water

ZWARE REGURGITATIES

Frequente regurgitaties van groot volume kunnen bijzonder verontrustend zijn. Ze hebben een ontegensprekelijke impact op de levenskwaliteit.

NOVALAC AR DIGEST+

Novalac AR DIGEST+ is speciaal ontwikkeld om episodes van regurgitatie, ernstige regurgitatie en GOR* te verlichten dankzij een innovatief indikkingsmiddel: het PAX-complex ⁽²⁾.

AANGEPASTE SAMENSTELLING

- PAX-complex ⁽²⁾: Gepatenteerd indikkingscomplex (pectine, johannesbroodpitmeel, zetmeel):
 - Efficiëntie indikking onafhankelijk van de zuurtegraad.
 - Verbeterd het digestief comfort
- Het verlaagde lactosegehalte verbetert de tolerantie.

BEWEZEN DOELTREFFENDHEID

- Significante vermindering van het volume en de frequentie van de regurgitaties. ⁽¹⁾ (p<0,001)
- Verbeterd de stoelgangconsistentie. ⁽¹⁾ (p=0,053)
- Bevordert het gewichtsherstel. ⁽¹⁾ (na 3 maanden p<0,001)



Product	Van - tot
Novalac AR Digest+ 800 g	0 – 36 maand



(1) Dupont, C., Vandenplas, Y., 2016. Efficacy and Tolerance of a New Anti-Regurgitation Formula. *Pediatr. Gastroenterol. Hepatol. Nutr.* 19, 104-109. <https://doi.org/10.5223/pghn.2016.19.2.104>

(2) Etiket Novalac AR Digest+/*GOR: Gastro-oesofageale reflux